



## **Analgex V**

**Uso Veterinário**

*Dipirona*

**ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEQUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA  
EQUINOS - ABATE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO  
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE  
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.**

### **Fórmula:**

Cada 100 mL contém:

Dipirona ..... 50,00 g

Veículo .....q.s.p. .... 100,00 mL

### **Indicações:**

Analgésico e antipirético para bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.

### **Via e Forma de Administração:**

Administrar pelas vias subcutânea, intramuscular e intravenosa (lenta).

### **Dose Terapêutica:**

Em média, 28 mg por kg de peso corporal.

### **Dosagem:**

#### **Bovinos e equinos:**

Administrar 20 mL do produto por animal adulto, o que corresponde aproximadamente a cerca de 25 mg/kg de peso corporal.

Em potros e bezeros, administrar 10 mL do produto por animal, o que corresponde a cerca de 28 a 56 mg/kg de peso corporal.

#### **Ovinos, caprinos e suínos:**

Administrar 10 mL por animal, o que corresponde a cerca de 40 a 50 mg/kg de peso corporal.

### **Intervalo entre doses:**

2 a 3 vezes ao dia, repetindo-se a cada 8 horas.

**As doses sugeridas bem como os intervalos e a duração do tratamento poderão se alterados a critério do Médico Veterinário.**

### **Contraindicações:**

Não administrar a gatos.

Não administrar a equinos de corrida, durante pelo menos 5 dias antes de uma competição.



**Interações medicamentosas:**

Não usar simultaneamente com barbitúricos ou fenilbutazona, porque o mecanismo de ação de ambas as drogas envolve o sistema enzimático microsômico.

Não administrar concomitantemente com clorpromazina, devido a riscos de hipotermia.

Quando associado a antibióticos aminoglicosídeos, o produto pode aumentar a incidência de nefrotoxicidade.

**Precauções:**

No caso de uso prolongado, a condição hematológica deve ser controlada, pois há relato de discrasia sanguínea. Doses excessivas poderão provocar acessos convulsivos.

Depois de aberto, o frasco deve ser mantido em geladeira; não congelar.

**Restrições de uso:**

Não usar o produto em equinos destinados ao consumo humano.

**Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30 °C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

**Apresentação:**

Frasco ampola de vidro âmbar contendo 50mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura  
sob nº 6.696 em 08/02/1999

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho  
CRF-SP nº 32.871

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO  
DO MÉDICO VETERINÁRIO**



Proprietário e Fabricante:  
**União Química Farmacêutica Nacional S/A.**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90 - Embu-Guaçu - SP  
CEP: 06900-000 - DDG: 0800 701 1799  
CNPJ: 60.665.981/0001-18 - Indústria Brasileira



4008302 - 90 x 150 mm - Latex 427