

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

EQUINOS: NÃO UTILIZAR O PRODUTO EM ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de bromexina..... 300,0 mg
Veículoq.s.p..... 100,0 mL

Propriedades:

Trata-se de um expectorante mucolítico assim denominado porque produz diminuição da viscosidade das secreções pulmonares.

A bromexina também altera a permeabilidade da barreira alvéolo-capilar, contribuindo para o aumento das concentrações de imunoglobulinas e certos antibióticos nas secreções pulmonares.

Tais efeitos, aliados à ação broncodilatadora, favorecem a expectoração e a melhora dos quadros de tosse com origem pulmonar.

Indicações: Equinos

- Coadjuvante no tratamento de bronquites e broncopneumonias agudas e crônicas
- Coadjuvante nos processos pneumônicos virais e verminoses pulmonares
- Nas metrites purulentas de éguas em associação com antibióticos.

Via e Forma de Administração:

Injetável por via intravenosa.

Posologia:

Dose Média:

0,15 a 0,3 mg de bromexina/kg de peso corporal/dia, sendo:

Equinos	25 a 30 mL
----------------	-------------------

Intrauterina

Dilua 50 mL de produto em 50 mL de água destilada e proceda à infusão intrauterina em éguas.



**Duração de Tratamento:**

Manter o tratamento até a remissão dos sintomas, variando de 3 a 5 dias.

Contraindicações: EDEMA pulmonar.**Limitação de Uso:**

No caso de bronquite verminótica, o produto deve ser administrado apenas 3 dias após o início do tratamento anti-helmíntico.

Precauções:

No caso de infecções primárias e/ou secundárias, fica a critério do Médico Veterinário associar o produto a antimicrobianos ou gamaglobulinas.

Efeitos Colaterais:

A Bromexina pode provocar distúrbios gastrointestinais leves e aumentar o nível de transaminase sérica.

Apresentação: Frascos-ampola de vidro âmbar, contendo 50 mL.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15° C a 30° C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, conteúdo deve ser utilizado em 30 dias

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 7.369 em 04/07/2000

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:

UNIAO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90

Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000

DDG: 0800 701 1799 – CNPJ: 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira

