

# CARVEROL®

carvão vegetal ativado 250 mg

Comprimido

 União Química

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Comprimido: embalagem contendo 20 comprimidos.

### USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

### COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido contém:

carvão vegetal ativado ..... 250 mg

Excipientes: glucose de milho, sacarose, celulose microcristalina, amido, lactose monoidratada, amidoglicolato de sódio, talco e estearato de magnésio.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para a redução do acúmulo de gases intestinais.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O carvão vegetal ativado está indicado como auxiliar no tratamento de intoxicações causadas por substâncias

tóxicas em quantidade pouco significativa ou de substâncias de baixa toxicidade.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Não usar o produto no caso de intoxicação aguda, ausência de sons intestinais, perfuração ou obstrução gastrointestinal, cirurgia recente e hemorragia (sangramento) gastrointestinal.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos de idade.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Gerais:** contraindicado durante a gravidez e para os casos de obstrução intestinal e alterações anatômicas do trato gastrointestinal. Não é recomendado utilizar o carvão ativado por longo período.

**Amamentação:** o produto não apresenta nenhum risco durante a amamentação

**Pediatria:** deve ser utilizado com precaução em crianças, uma vez que o carvão ativado pode interferir na absorção de nutrientes. Não é recomendável o uso por crianças menores de 12 anos de idade.



70 mm

**Idosos:** pessoas idosas por apresentarem digestão mais lenta, estão mais predispostas a apresentarem constipação intestinal (prisão de ventre), devendo utilizar o produto com maior cautela.

Atenção: Deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes.

Atenção: contém 95 mg de sacarose /unidade farmacotécnica.

Atenção: contém 45 mg de lactose /unidade farmacotécnica.

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose, e com insuficiência de sacarose-isomaltase.

Atenção, portadores de Doença Celíaca ou Síndrome Celíaca: contém glúten

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### Interações medicamentosas

Este produto pode interagir com outros medicamentos, portanto deve ser administrado, no mínimo, duas horas antes ou uma hora após outras medicações.

### Interferência em exames laboratoriais

CARVEROL não apresenta interferência em exames laboratoriais.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

70 mm

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (de 15°C a 30 °C) e proteger da umidade.

O prazo de validade é de 24 meses após a data de fabricação (vide cartucho).

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Aspecto físico:** comprimido preto, biconvexo, circular, liso.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Adultos:** 4 a 6 comprimidos por dia, em duas doses divididas, nos intervalos das refeições.

**Crianças acima de 12 anos:** metade da dose indicada para adultos, com um pouco de água.

Ingerir até 1 g ao menos 30 minutos antes das refeições e até 1 g após as refeições.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orien-**

**tação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer de tomar um comprimido, tome tão logo você se lembre. Se estiver quase na hora do comprimido seguinte, pule o comprimido que você perdeu e volte a tomar no seu horário habitual. Nunca tome 2 comprimidos ao mesmo tempo.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Este medicamento pode causar: constipação intestinal (prisão de ventre), desequilíbrio eletrolítico, obstrução gastrointestinal, hipotensão (diminuição da pressão arterial), vômitos ou diarreia.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdose com o uso de CARVEROL, mesmo porque, o carvão medicinal não é absorvido.

70 mm



**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE.**

MEDICAMENTO NOTIFICADO  
conforme RDC nº 576/2021.

Notificado por:  
**UNIÃO QUÍMICA**  
**FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90  
Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-095  
CNPJ 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

Produzido por:  
**UNIÃO QUÍMICA**  
**FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Brasília – DF  
Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1559

70 mm

