

7 17981 77113 0639

**Composição:** Cada dose de vacina contém (antes da inativação de cada agente): IBR (HBV1  $\geq 10^{7,26}$  DICT 50%/dose) e (HVB5  $\geq 10^7$  DICT 50%/dose), vírus de DVB ( $\geq 10^{4,50}$  DICT 50%/dose), *Leptospira interrogans* serovares Pomona ( $\geq 1 \times 10^7$  Bact/dose), Icterohaemorrhagiae ( $\geq 1 \times 10^7$  Bact/dose), Canicola ( $\geq 1 \times 10^7$  Bact/dose), Hardjo ( $\geq 1 \times 10^7$  Bact/dose), Wolffii ( $\geq 1 \times 10^7$  Bact/dose), *Leptospira borgpetersenii* serovar Tarassovi ( $\geq 1 \times 10^7$  Bact/dose), *Leptospira kirschneri* serovar Grippotyphosa ( $\geq 1 \times 10^7$  Bact/dose), *Campylobacter foetus foetus* ( $\geq 10^8$  UFC/dose), *Campylobacter foetus venerealis* ( $\geq 10^8$  UFC/dose) e *Histophilus somni* (*Haemophilus somni*) ( $\geq 10^8$  UFC/dose), com adjuvante Pilatus GHAS00<sup>®</sup>. Hidróxido de Alumínio de Alta Adsorção Proteica, solução fisiológica tamponada q.s.p. 5 mL. **Indicação:** Vacina para prevenção das enfermidades reprodutivas dos bovinos, produzida pela ação individual ou combinada dos seguintes agentes: Rinotraqueíte Infecciosa Bovina HBV1 e HVB5, Diarréia Viral Bovina, *Leptospirose* serovares Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjo, Tarassovi, Grippotyphosa, Wolffii, *Campylobacteriose* e por *Histophilus somni* (*Haemophilus somni*). **Dosagem e via de aplicação:** Aplicar 5 mL por via subcutânea. **Cronograma vacinal para orientação:** Bezerros: aplicar duas doses com 60 e 30 dias antes do desmame. Vacas, novilhas e touros: (sem histórico anterior de vacinação e soronegativos): vacinar o quanto antes e revacinar 30 dias após a primeira dose. Vacas, novilhas e touros (com histórico anterior de vacinação): revacinar 30 dias antes do serviço/monta. Em fêmeas prenhes, recomenda-se vacinar duas doses com um intervalo de 20 a 30 dias, durante 6<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup> mês de gestação. Revacinar anualmente com dose única 30 dias antes do serviço. O esquema sugerido pode ser alterado de acordo com a recomendação de um médico veterinário. Caso necessário e sob orientação de um Médico Veterinário: vacinar todas as categorias em período reprodutivo, a cada 6 meses. **Precauções e Advertências:** Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. EVITAR A AUTO-INOCULAÇÃO. A auto-inoculação poderá provocar reação inflamatória o local, sem perigo à saúde. No caso de contato acidental com o produto, entre em contato imediatamente com um médico. Não vacinar animais enfermos, subnutridos, parasitados ou sob condições de estresse. Agitar bem o frasco antes de usar. Desinfetar o local da aplicação e usar seringas e agulhas estéreis. A vacina pode gerar uma reação no local da aplicação que desapareça progressivamente. Em caso de reação anafilática, administrar epinefrina 1% ou equivalente. Verificar o prazo de validade do produto. Uso concomitante com substâncias antibióticas e/o anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação. **Conservação:** Conservar entre 2°C a 8°C, devendo ser protegido da luz solar, calor e congelamento. Uma vez aberta, a vacina deverá ser utilizada dentro de 24 horas.

Proprietário e fabricante: Tecnovax S.A. - Luis Viale 2835 (C1416DNU) Cidade de Buenos Aires, Argentina. ■ SENASA: Cert. Nº 09-102. Estab. Heb. Nº 8520. Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: Tecnovax do Brasil Importação e Comércio de Produtos Veterinários Ltda. - Rua das Castanheiras 200, G 55/56 - Hortolândia - SP - CNPJ: 14.711.769/0002-03. Responsável Técnico: Dra Bibiana Carneiro CRMV-SP: 9782. Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.170/2015. Vencimento: 12 meses após a data de fabricação.

PACON 0317-2

PART:

FAB.:

VEN.:

**Providean<sup>®</sup>**

**REPRO 12**

**Vacina Inativada contra a Síndrome Reprodutiva Bovina**

IBR • DVB • *Leptospira interrogans* serovars Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Hardjo, Wolffii, *Leptospira borgpetersenii* serovar Tarassovi, *Leptospira kirschneri* serovar Grippotyphosa • *Campylobacter foetus foetus* • *Campylobacter foetus venerealis* • *Histophilus somni* (*Haemophilus somni*.)

250 mL • 50 DOSES

**Providean<sup>®</sup> REPRO 12**

PRODUTO IMPORTADO

TECNOVAX

USO VETERINÁRIO