



# Flamavet®

## Meloxicam 0,2 %

USO VETERINÁRIO

### Fórmula:

Cada 1,0 mL contém:

Meloxicam ..... 2,0 mg  
Veículo q.s.p ..... 1,0 mL

### Informações técnicas:

**Meloxicam** é classificado como um anti-inflamatório não esteroidal (AINE), que possui atividade analgésica e antipirética. Pertence à classe do ácido enólico, um dos derivados de Oxicam. Esta classe de fármacos inibe a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), da fosfolipase A2 e da síntese de prostaglandinas. Os AINEs podem ter sua maior ou menor segurança, de acordo com o grau de seletividade perante as ciclo-oxigenase (COX), enzimas que participam da síntese de prostaglandinas. As COX podem ser classificadas de maneira simplificada como COX-1, que é expressa constitutivamente na maioria dos tecidos e está associada a eventos fisiológicos como a integridade da mucosa gástrica, fluxo sanguíneo renal e na coagulação sanguínea, e COX-2, que é uma enzima de ação induzida relacionada aos eventos da resposta inflamatória. Como o meloxicam apresenta atividade seletiva para COX-2, isto confere uma segurança maior em relação aos efeitos adversos.

### Indicações:

**Flamavet 0,2%** é indicado como anti-inflamatório e analgésico para dor leve a moderada para cães e gatos

### Posologia e modo de usar:

Administrar **Flamavet 0,2%** uma vez ao dia, de acordo com a tabela abaixo:

Espécie	1º dia de tratamento	2º dia e tratamentos subsequentes	Via de Administração
Cães	0,2 mg/kg	0,1 mg/kg	IV ou SC
Gatos	0,1 mg/kg	0,05 mg/kg	SC

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. De acordo com os estudos de segurança realizados, a duração do tratamento poderá ser extrapolada por até 7 dias em cães adultos e até 4 dias em gatos adultos, ou a critério do Médico Veterinário.

### Contraindicações:

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Não administrar o produto em animais com histórico de ulceração gastrointestinal ativa. Deve ser utilizado com cautela em pacientes hepatopatas, cardiopatas, doentes renais e com distúrbios hematológicos.

Não utilizar em animais desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, já que nesses quadros haverá um risco maior de toxicidade renal.

### Interações medicamentosas:

Não administrar o **Flamavet 0,2%** junto com outros anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais e anticoagulantes devido ao maior risco de toxicidade gastrointestinal e sangramentos. Não utilizar com as medicações: digoxina, fluconazol, metotrexato e drogas nefrotóxicas como furosemida, antibióticos aminoglicosídeos, entre outros. Alguns AINES

70 mm

70 mm

70 mm

podem reduzir o efeito dos inibidores da ECA sobre a pressão arterial e aumentar o risco de nefrotoxicidade.

**Efeitos adversos:**

Os efeitos adversos mais comumente relatados são náuseas, vômitos, perda de apetite, apatia, diarreia, melena e ulceração gástrica. Elevação de enzimas hepáticas, prurido, azotemia, aumento da creatinina e falência renal também já foram descritos.

Como outros anti-inflamatórios não esteroidais inibidores de COX-2, meloxicam pode apresentar efeitos na função plaquetária.

Em casos de anafilaxia, interromper o uso do medicamento imediatamente.

**Precauções:**

- Uso exclusivo em cães e gatos, na posologia indicada em bula.
- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.
- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.
- Manter o produto em sua embalagem original.
- Manter o produto livre de contaminações externas.
- Até o momento, não foram realizados estudos em animais jovens, fêmeas prenhes ou lactantes.

**Superdosagem:**

No caso de superdosagem, realizar o tratamento suporte e sintomático, a critério do médico veterinário.

**Apresentação:**

Frasco de vidro incolor de 20 mL

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em até 30 dias.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  
SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000292-5.000078, de 23/04/2024.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871



Proprietário e Fabricante:

**UNIAO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.**

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90

Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095

DDG 0800 701 1799 – CNPJ: 60.665.981/0001-18

©Marca Registrada - Indústria Brasileira

Fabricante:

**UNIAO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A.**

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.555

Guarulhos - SP - CEP: 07112-070

CNPJ: 60.665.981/0012-70



4037020 - 100 x 150 mm - PHC 400

70 mm