



Emedron®

Ondansetrona 5 mg, 10 mg e 20 mg

USO VETERINÁRIO

ANTIEMÉTICO PARA CÃES E GATOS

Fórmula:

Cada comprimido de Emedron 5 mg contém:

Cloridrato de Ondansetrona Diidratado* 6,235 mg
Excipiente q.s.p 125 mg
* Equivalente a 5 mg de ondansetrona base.

Cada comprimido de Emedron 10 mg contém:

Cloridrato de Ondansetrona Diidratado* 12,470 mg
Excipiente q.s.p 250 mg
* Equivalente a 10 mg de ondansetrona base

Cada comprimido de Emedron 20 mg contém:

Cloridrato de Ondansetrona Diidratado* 24,940 mg
Excipiente q.s.p 500 mg
* Equivalente a 20 mg de ondansetrona base

Informações técnicas:

Ondansetrona é uma medicação antiemética. Seu mecanismo de ação ocorre pelo antagonismo altamente seletivo dos receptores 5-HT₃ da serotonina, o que lhe confere maior segurança. Esses receptores são encontrados no sistema nervoso central (SNC) e são mediados pela Zona Quimiorreceptora Bulbar (CTZ), responsável pelo vômito.

Indicações:

Emedron é um medicamento utilizado na prevenção e tratamento de êmese, em cães e gatos.

Posologia e modo de usar:

O produto deve ser administrado exclusivamente pela via oral, conforme dosagem da tabela abaixo:

Espécies	Dosagem	Tratamento
Cães e Gatos	5mg 10mg 20mg	0,5mg a 1,0mg/Kg

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro e a remissão dos sintomas. De acordo com os estudos de segurança conduzidos nas espécies, a dose e o tratamento foram extrapolados para 1 mg/kg, a cada 8 horas, por 5 dias consecutivos.

Contraindicações:

Não utilizar medicamentos com o prazo de validade vencido.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

O produto não deve ser utilizado em fêmeas prenhes ou lactantes, e em cães ou gatos com menos de 12 meses de idade.





Interações medicamentosas:

Não administrar o Emedron junto com os seguintes princípios ativos:

Apomorfina: em seres humanos já houve relatos de hipotensão severa com o uso concomitante das duas medicações.

Tramadol: em seres humanos é relatada a diminuição de eficácia de ambos os fármacos quando utilizados em associação.

Medicações que afetam o intervalo QT no eletrocardiograma: (amiodarona, cisaprida, halotano e isoflurano), a interação pode resultar em arritmias graves.

Efeitos adversos:

A Ondansetrona é um princípio ativo bem tolerado.

Sinais como constipação, sedação, sinais clínicos extrapiramidais (alterações do tônus muscular, movimentos involuntários anormais e tremores), arritmias e hipotensão já foram relatados em seres humanos, nos quais a incidência é menor que 10%.

Precauções:

Uso exclusivo em cães e gatos na posologia indicada em bula. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos.

Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo. Ler a bula atentamente antes de administrar o produto. Manter o produto em sua embalagem original. Até o momento, não foram realizados estudos em animais jovens, fêmeas prenhes ou em lactação. A Ondansetrona pode mascarar a distensão gástrica ou íliaca e, portanto, não deve ser utilizada em substituição às manobras convencionais nessas situações. Utilizar com cautela em animais com disfunção hepática, já que a meia-vida pode ser prolongada. Utilizar com cautela em cães com mutação do gene MDR1, já que até então não se sabe a respeito da sua relação com a glicoproteína P na espécie.

Superdosagem:

Embora doses acima de 10 vezes a posológica não tenham causado morbidade significativa na espécie humana, alguns indivíduos que sofreram superdosagens, reportaram sintomas de cegueira repentina e transitória, constipação, hipotensão e fraqueza.

Nos estudos de segurança conduzidos nas espécies alvo, foram administradas doses superiores às recomendadas em bula, e não foram reportados eventos adversos nos animais.

Apresentação:

Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos.

Display com 10 blisters com 10 comprimidos cada, com 8 blisters com 10 comprimidos cada e 6 blisters com 10 comprimidos cada.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C),
ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
sob o nº SP 000292-5.000032 em 04/08/2021.

Responsável Técnico:

Vânia Nazaré Alves de Carvalho
CRF-SP 32.871



Proprietário e Fabricante:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - São Paulo - CEP 06900-000
DDG 0800 701 1799 - CNPJ 06.665.981/0001-18 - Indústria Brasileira

